


EL ARTE DE CAMBIAR DE ANTIPSICÓTICOS

Objetivo: Que el paciente permanezca estable. Suavidad en el cambio. Mientras se sube la dosis de uno, se baja la de otro. Es importante completar la transición, aunque en medio del proceso hayamos notado mejoría del paciente.

Mejor de una Pina a una Pina o de una Dona a una Dona. Pero esto no es siempre posible.



De Pina a Dona	Detener Pina lentamente (2 semanas) Evitamos rebote anticolinérgico, agitación e insomnio. En caso de Clozapina (4 semanas de ajuste).
De Dona a Pina	Ajustar la Pina al alza (2 semanas). La Dona se puede detener más rápido (1 semana)

Caso especial: ARIPIPRAZOL

De Pina a Aripiprazol	Dosis media de Aripiprazol (3-7 días hasta ajustar dosis total). La Pina se ajusta durante 2 semanas, hasta su abandono.
De Dona a Aripiprazol	Dosis media de Aripiprazol (3-7 días hasta ajustar dosis total). La Dona puede ajustarse hasta su abandono en 1 semana.
De Aripiprazol a Pina	Retirada inmediata de Aripiprazol y se inicia dosis media de Pina, ajustando al alza 2 semanas.
De Aripiprazol a Dona	Retirada inmediata de Aripiprazol y se inicia Dona a dosis media, ajustando al alza 1 semana.

Regularidades:

Cuando pasamos de Aripiprazol a una Pina o a una Dona, el Aripiprazol se deja de forma inmediata.

Cuando dejamos Pinas o Donas para pasar a Aripiprazol, el ajuste de este dura de 3 a 7 días, comenzando con una dosis media (NUNCA BAJA)

